



DermaDoc

Dr Maria-Pia G Kuylenstierna

Leg. läk Spec. hudsjukdomar

Tfn 036-12 90 95

### **Injektionsbehandling av ytliga blodkärl på benen (Teleangiektasier)**

Injektionen är förenad med ringa smärta eftersom medlet har lokalbedövningseffekt – namnet på läkemedlet som används är AETHOXYSKLEROL.

Övergående (från minuter till timmar) hudrodnad och klåda i anslutning till injektionsstället kan förekomma.

De injicerade blodkärlen blir blåa och det injicerade området kan bli mer framträdande än tidigare de första veckorna efter behandlingen.

Vid missfärgning av huden kan läkningen påskyndas genom behandling med Hirudoidsalva (kan köpas receptfritt på Apotek). Salvan appliceras 2-3 gånger dagligen i 2 veckor från det att kompressionsförbandet har avlägsnats.

Missfärgningar (brun hudpigmentering) av huden kan kvarstå hos några procent av de behandlade patienterna men denna missfärgning avtar med tiden och är normalt försvunnen inom något år.

Efter injektionen appliceras en gasvävskudde under tryck på det behandlade området och benen lindas med elastisk kompressionsbinda som bör sitta kvar i 3 dygn. Därefter borttages gasvävskudden och benen lindas med elastisk kompressionsbinda eller kompressionsstrumpa i flera veckor (ju längre desto bättre resultat).

Promenera gärna 10-30 minuter efter injektionsbehandlingen. Veckan efter behandlingen kan Du röra Dig som vanligt. Promenera gärna men undvik över-ansträngning. Om du måste stå stilla – rör ofta på foten och tårna. Om Du har ont i benen – promenera.

Undvik att få sol på benen så länge som missfärgningen kvarstår.